AVERTISSEMENT AGERICO LEES WAY

BULLETIN TECHNIQUE seb sup DES

Pucerons **2NOITAT2** DLP-6-7-7745266 D'AVERTISSEMENTS

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture

Villa Blanche - 62, Avenue Nationale - La Neuvillette, 51100 REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82 and and of Châlons-sur-Marne of Angellette

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

BULLETIN nº 106 - 30 JUIN 1977 Dans la majorité des cas une intervention ne secquetificacione pa

Abonnement annuel: 50 F

déconseillé,

VIGNE

oide des populations tout traitement est d

Mildiou

Maladies des céréales La vigilance recommandée par notre précédent avis reste nécessaire. En effet des taches "en fleur" sont présentes un peu partout. On nous a même signalé des attaques sur grappes (Rot-gris) dans l'Aube. La floraison s'amorçant nous recommandons de préférence l'utilisation de fongicides de synthèse. de rouille brune et d'ofdium.

Oldium : Maintenir la protection Compte-tenu du stade végétatif atteint maintei

Pourriture grise

La maladie étant présente un peu partout il peut être prudent de mettre-en oeuvre le système, maintenant classique, de quatre traitements spécifiques, le premier se situant fin floraison-début nouaison.

Erinose : Les dégâts de cet acarien sont fréquents cette année. Lorsqu'on en observe il convient d'appliquer des soufres en poudre pour lutter également contre l'oïdium. Ceci est encore plus vrai sur les cépages blancs, les plus sensibles aux attaques tant d'oïdium que d'érinose.

Cochylis

Le ler vol a été faible, néanmoins dans les parcelles "à vers" une lutte curative peut encore être utilement mise en oeuvre.

ARBORICULTURE FRUITIERE

Carpocapse des pommes

Quelques pénétrations sur arbres non traités ont été observées le 27 juin. Elles paraissent pour l'instant fort peu nombreuses, probablement en raison des pluies et de l'humidité qui ont "entravé" la ponte des papillons.

Compte-tenu des précipitations de ces derniers jours, la protection des arbres doit être renouvelée et maintenue jusqu'à la mi-juillet.

GRANDE CULTURE

Mildiou de la pomme de terre

Sur variétés sensibles à la maladie il est conseillé de renouveler dès que possible la protection dont nous avions recommandé l'application avant le 22 juin.

Tordeuse du pois

Les conditions se maintiennent peu favorables à l'évolution normale du parasite et les risques prochains de dégâts sont limités. Dans les secteurs habituellement affectés par cette tordeuse il est conseillé de réaliser une première application insconicide pour le

Imprime de Station de CHAMPAGNE-ARDENNE - Directeur-Gérant P. JOURNET

P.1.191

Dans les cultures présentant encore des fleurs, il est indispensable de n'utiliser que des insecticides reconnus non dangereux pour les abeilles.

Pucerons sur pois

Un début de pullulation a été remarqué il y a une dizaine de jours. En raison d'une régression rapide des populations tout traitement est déconseillé.

Puceron de l'épi des céréales

Dans la plupart des secteurs les populations de pucerons régressent très sérieusement sous l'action de leurs parasites naturels. D'autre part de nombreux blés atteignent le stade pateux-farineux, à partir duquel les pucerons ne sont plus dommageables.

EDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

noiblim,

Tordeuse du pois

Dans la majorité des cas une intervention ne se justifie donc plus.

Maladies des céréales

A la faveur des conditions climatiques exceptionnelles ayant caractérisé ce mois de juin, on observe sur blé d'hiver des attaques sur épi (oïdium, fusariose, septoriose). On constate également sur feuilles une progression rapide de nécroses dûes aux attaques de rouille brune et d'oïdium.

Compte-tenu du stade végétatif atteint maintenant par les blés tout traitement est déconseillé.

La maladie étant présente un peu partout il peut être prudent de mettre en oeuvre le système, maintenant classique, de quatre traitements spécifiques, le premier se situant fin floraison-début nouaison.

de chef de la Circonscription,

Exinose : Les degats de cet active sont fréquents cette année. Lorsqu'on en observe il

convient d'applique ATTRISQUETES en poudre pour lutter également contre l'oïdium. Ceci est
encore plus vrai sur les cépages blancs, les plus sensibles aux attaques tant d'oïdium que
d'érinose.

Cochylis

Le ler vol a été faible, néammoins dans les parcelles "à vers" une lutte curative
peut encore être utilement mise en oeuvre.

ARHORICULTURE FRUITIERE

Carpocapse des pormes

Quelques pénétrations sur arbres non traités ont été observées le 27 juin, Elles
paraissent pour l'instant fort peu nombreuses, probablement en raison des pluies et de
l'humidité qui ont "entravé" la ponte des papillons.

Compte-tenu des précipitations de ces derniers jours, la protection des arbres doit être renouvelée et maintenue jusqu'à la mi-juillet.

GRANDE CULTURE

Mildiou de la pomme de terre

Sur variétés sensibles à la maladie il est conseillé de renouveler dèa que possible la protection dont nous avions recommandé l'application avant le 22 juin.

Les conditions se maintiennent peu favorables à dA (e22 essarq eb reique un annouver les risques prochains de dégâts sont limités. Dans les secteurs habituellement affectés par cette entdause il est conseillé de réaliser une première application insecutores rous le 5 juilletation de champagne au brechungement, sounner